DUCANIT

Zalecenia stosowania

Nawozenie dolistne – jednorazowa dawka nawozu: 5-10 kg na ha w zależności od gatunku, celu stosowania oraz fazy rozwojowej uprawy. Zabieg wykonać najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

Uprawy pod osłonami - nawożenie dolistne – roztwór do opryskiwania przygotowujemy poprzez rozpuszczenie 0,3-1 kg nawozu w 100 litrach wody (w zależności) od gatunku i fazy rozwojowej). Zabieg wykonać z dodatkiem zwilżacza w taki sposób, aby ciecz dokładnie pokryła całe rośliny, wykonać najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

Fertygacja – rośliny podlewamy w zależności od gatunku i fazy rozwojowej wodnym roztworem nawozu o stężeniu 0,01-0,2 % (0,1-2 kg / 1000 l roztworu). W przypadku sporzadzenia roztworów stężonych należy rozpuszczać je w innym zbiorniku niż nawozy zawierajace fosforany i siarczany.

NAWOŻENIE DOLISTNE

RODZAJ UPRAWY	ŚR. ZALECANE STĘŻ. CIECZY % (KG/100L WODY)	LICZBA DAWEK	ODSTĘP CZASU POMIĘDZY ZABIEGAMI (DNI)
Warzywa gruntowe	0,5-1,0	3-4	10-14
Truskawki owocujące	0,2-0,3	2-3	5-7
Mateczniki truskawek	0,2-0,5	3-4	7-10
Rośliny jagodowe	0,3-0,5	2-3	5-7
Sady	0,3-1,0	4-6	10-14
Szkółki ozdobne, owocowe i leśne	0,-0,5	2-3	10-14

Pożywki stężone (koncentraty) sporządzamy w przypadku dysponowania dozownikami nawozów lub innymi urządzeniami pozwalającymi na rozcieńczenie pożywek stężonych w określonym stosunku do wody (najczęściej 1:100). W celu sporządzenia koncentratu należy do 1000-litrowego zbiornika wlać 750 litrów wody o temperaturze 25 stopni C, a następnie stopniowo wsypywać 50 do 150 kg nawozu. Po całkowitym rozpuszczeniu nawozu uzupełnić roztwór wodą do objętości 1000 l. Rozcieńczenie tak przygotowanego roztworu w stosunku 1:100 pozwala na otrzymanie gotowej pożywki o stężeniu 0,05-0,15%