LOVOFERT CN 15

N [Ca] 15 [26]

Zastosowanie:
Azotan wapnia jest nawozem całkowicie rozpuszczalnym w wodzie o szybkim działaniu. Ma szczególnie korzystny wpływ na gleby kwaśne, ponieważ zawarty w nawozie wapń neutralizuje kwasowość gleby. Ze względu na wysoką mobilność azotu w glebie oraz ryzyko wymywania odradza się stosowanie większych dawek azotanu wapnia na lekkich glebach piaszczystych, na obszarach o obfitych opadach oraz ogólnie w przypadku pojedynczych dawek przekraczających 300 kg/ha. Zaleca się go przede wszystkim do nawożenia regeneracyjnego upraw ozimych, do późnego (jakościowego) nawożenia zbóż, do nawożenia osłabionych upraw koniczyny, do nawożenia buraków cukrowych i pastewnych, maku, kukurydzy, upraw łąkowych i warzyw, a także do operacyjnego uzupełniania niedoborów wapnia w odżywianiu roślin.

Zalecane dawkowanie:

Kultura	**Ilość w kg/ha**
Drzewa owocowe	200 – 500 – 2 zabiegi – w okresie kwitnienia i na początku zawiązywania owoców
Melony, dynie	180 - 240
Jęczmień letni	250 - 400 wiosną
Pszenica jara	150 - 200 wiosną, 200 – 250 w okresie wegetacyjnym
Warzywa korzeniowe	250 - 400 wiosną, 250 – 400 w okresie wegetacyjnym
Łąki i pastwiska	200 - 600 wiosną, 300 – 600 w okresie wegetacyjnym
Warzywa korzeniowe, warzywa krzyżowe	180 - 360 w okresie wegetacyjnym
Warzywa owocowe	180 - 240 w okresie wegetacyjnym
Cebula i warzywa liściaste	max. 180 w okresie wegetacyjnym
Młode ziemniaki	max. 180 w okresie wegetacyjnym
Rośliny strączkowe	max. 140 w okresie wegetacyjnym
Owoce, owoce pestkowe, drobne owoce	180 - 360 w okresie wegetacyjnym (w zależności od stopnia płodności)
Truskawki	max. 360 w okresie wegetacyjnym
Winorośl	50 - 100 w okresie wegetacyjnym

Wykaz wszystkich składników, które stanowią ponad 5 procent masy nawozu: azotan wapnia CAS 10124-37-5 (CMC 1), azotan amonu CAS 6484-52-2 (CMC 1)
CMC 1: Substancje i mieszaniny wytworzone z nieprzetworzonych surowców